
REINIGEN VAN DE PENIS EN KOKER BIJ HET PAARD

VRAAG

“Wat is het advies met betrekking tot het reinigen van de penis en koker van een paard (Hoe, frequentie, welke producten worden daarvoor gebruikt)?”

ANTWOORD

De talgklieren in de koker vormen talg. Wanneer de talg zich met vuil vermengt, ontstaat smegma, wat kan leiden tot irritatie. Tekenen van irritatie zijn een gezwollen koker of smegma aan de binnenkant van de benen.

De frequentie voor het reinigen van de penis verschilt van paard tot paard en hangt ook af van de ouderdom van het paard. Bij oudere ruinen wordt aangeraden dit maandelijks te doen. Aanvankelijk verloopt het reinigen meestal moeizaam en is sedatie vaak een noodzaak. Acepromazine (ACP) is daarbij het aangegeven product. De dosering gaat van 0,05 mg/kg tot 0,1 mg/kg IV. Na toediening dient vijftien minuten gewacht te worden. Het paard is dan licht geseedeerd

en schacht uit. Als de penis echter wordt vastgenomen, schacht hij vaak terug in. Wanneer dit gebeurt, is het aan te raden een bijkomende alfa2-agonisten toe te dienen, i.e. detomidine, romifidine of xylazine.

Het is raadzaam een spons (waarvan het gebruik uiteraard beperkt wordt tot één paard) en lauw water te gebruiken. Bij goedgekeurde dekhengsten of internationaal transport van paarden wordt soms een 4%-chlorhexidine- of isobetadine-oplossing gebruikt. Echter, indien dat niet nodig is, wordt de toediening ervan afgeraden, omdat de oplossing tot nog meer irritatie kan leiden.

Het paard moet wennen aan deze behandeling. Wanneer het proces frequent herhaald wordt, reageren de ruinen/hengsten meestal beter. Bij massage van de koker met lauw water schachten ze vaak spontaan uit.

Dierenarts D. Van Hende
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren,
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent,
Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke

Dieren in de literatuur**Kat dood**

Sinds de kat dood is,
Moet ik minder stofzuigen
En vaker huilen.

Johan Sebastiaan Stuer.
In Humo 23 januari 2020